



ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Вакцина коревая культуральная живая

Вакцина для профилактики кори

лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России, Россия

Изменение № 2

Дата внесения Изменения « » 27 04 17 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Показания к применению.</p> <p>Плановая и экстренная профилактика кори.</p> <p>Плановые прививки проводят двукратно в возрасте 12 мес и 6 лет детям, не болевшим корью.</p> <p>Детей, родившихся от серонегативных к вирусу кори матерей, вакцинируют в возрасте 8 мес и далее – в 14-15 мес и 6 лет. Интервал между вакцинацией и повторной прививкой должен быть не менее 6 мес.</p> <p>Дети в возрасте от 1 года до 18 лет включительно и взрослые в возрасте до 35 лет (включительно), не привитые ранее, не имеющие сведе-</p>	<p>Показания к применению.</p> <p>Плановая и экстренная профилактика кори.</p> <p>Плановые прививки проводят двукратно в возрасте 12 мес и 6 лет детям, не болевшим корью.</p> <p>Детей, родившихся от серонегативных к вирусу кори матерей, вакцинируют в возрасте 8 мес и далее – в 14-15 мес и 6 лет. Интервал между вакцинацией и повторной прививкой должен быть не менее 6 мес.</p> <p>Дети в возрасте от 1 года до 18 лет включительно и взрослые в возрасте до 35 лет включительно, не привитые ранее, не имеющие сведе-</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>ний о прививках против кори не болевшие корью ранее вакцинируются в соответствии с инструкцией по применению двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками. Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.</p> <p>Экстренную профилактику проводят контактными лицам без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитым. При отсутствии противопоказаний вакцину вводят не позднее, чем через 72 ч после контакта с больным.</p>	<p>ний о прививках против кори, не болевшие корью ранее; взрослые от 36 до 55 лет включительно, относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не привитые ранее, не имеющие сведений о прививках против кори, не болевшие корью ранее вакцинируются в соответствии с инструкцией по применению двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками. Лица, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.</p> <p>Экстренную профилактику проводят контактными лицам без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических</p>

Старая редакция	Новая редакция
	ких прививках против кори или однократно привитым. При отсутствии противопоказаний вакцину вводят не позднее, чем через 72 ч после контакта с больным.

Исполнительный директор
ФГУП «НПО «Микроген»
Минздрава России



О.В. Черничук

Федеральное
научно-профилактическое
объединение полимедическим
и мнмнстерства здравоохранения
российской федерации



МИНЗДРАВ РСФСР
ЛС-002140- 218
СОГЛАСОВАНО

Пронито, промульствовано и
скреплено печатью
3 листа(ов)

21.12.2016

Исполнительный директор
ФГУП «ИПО «МИКРОГЕН»
МИНЗДРАВА РОССИИ
О.В. Черныук